

PrEP frente a PEP

Cuando usted toma medidas para protegerse contra una enfermedad, como la causada por el VIH, eso se llama profilaxis. La PrEP y la PEP son medidas de protección para las personas VIH-negativas.

PrEP significa profilaxis preexposición.

Antes de la exposición al VIH.

La PrEP se toma antes de las relaciones sexuales, el uso de drogas u otra exposición al VIH.

La PrEP es para personas que no tienen el VIH y que:

- corren el riesgo de contraerlo por medio de las relaciones sexuales.
- corren el riesgo de contraerlo por el uso de drogas inyectables.

El uso constante de la PrEP puede reducir el riesgo de contraer el VIH por medio de las relaciones sexuales en proporción aproximada del 99% y del uso de drogas inyectables al menos un 74%.

Pídale a su proveedor de atención de salud una receta para la PrEP o busque en PrEPLocator.org uno en su localidad que pueda recetársela.

¿Cómo se llama?

PEP significa profilaxis posexposición.

¿Cuándo se toma?

Después de la exposición al VIH.

En situaciones de emergencia, la PEP se inicia dentro de las 72 horas siguientes a la posible exposición y se toma durante un mes a partir de entonces.

¿Para quién es?

La PEP es para las personas que no tienen el VIH pero que pueden haber estado expuestas:

- Durante las relaciones sexuales.
- Durante una agresión sexual.
- Al compartir equipo de inyección de drogas.
- En el trabajo por medio del pinchazo de una aguja o de otra lesión.

¿Qué tan eficaz es?

La PEP puede prevenir el VIH cuando se toma correctamente, pero no siempre es eficaz. Comience la PEP lo más pronto posible para darle la mayor posibilidad de surtir efecto.

¿Cómo se obtiene?

Dentro de las 72 horas siguientes a la posible exposición al VIH, solicítele una receta de PEP a su proveedor de atención de salud, al servicio de cuidado de urgencia o al personal de la sala de emergencia.

Para obtener más información, visite HIVinfo.NIH.gov/es.